

Critical functions on Riemannian manifold wich are locally Eucliden

moubinool omarjee

1^{er} février 2008

Résumé

In this note we will show the existence of criticals functions for the functional $I_{f,h}$ where h is a critical function for the metric g of M Riemannian manifold of dimension greater than 4.

INTRODUCTION :

Let M a compact Riemannian manifold of dimension greater than 4 locally Eucliden , h a function in $C^\infty(M)$, we define for $\phi \in H_1^2(M) - \{0\}$

$$I_{f,h}(\phi) = \frac{\int_M |\nabla \phi|_g^2 dv_g + \int_M h \phi^2 dv_g}{\left(\int_M f \phi^{\frac{2n}{n-2}} dv_g\right)^{\frac{2}{2^*}}}$$

where $2^* = \frac{2n}{n-2}$ critical Sobolev exponent, $f \in C^\infty(M, R_+^*)$ we will write

$$\mu_{f,h} = \inf\{ I_{g,h}(\phi) | \phi \in H_1^2(M), \phi \not\equiv 0 \}$$

Définition 1 *We say that h is weakly critical for g if*

$$\mu_{f,h} = \frac{1}{K(n,2)(\sup f)^{\frac{n-2}{n}}}$$

Définition 2 *We say h is critical for g if it is weakly critical and for any $k \in C^\infty(M)$ such that $k \neq h$ we have $k \leq h$,*

$$\mu_{f,k} < \frac{1}{K(n,2)(\sup f)^{\frac{n-2}{n}}}$$

Définition 3 *We say that $\phi \in H_1^2(M) - \{0\}$ is an extremal for h if*

$$I_{f,h}(\phi) = \mu_{g,h}$$

Standard elliptic arguments show that an extremal functions belongs to et qu'elle est soit strictement positive ou strictement négative, on peut supposer qu'elle est strictement positive. Rechercher une fonction extrémale est équivalent à trouver une fonction $\phi \in H_1^2(M) - \{0\}$ telle que

$$\Delta_g \phi + h\phi = \frac{1}{K(n, 2)(\sup f)^{\frac{n-2}{n}}} f \phi^{2^*-1} \quad \text{et} \quad \int_M f \phi^{2^*} dv_g = 1$$

Théorème 1 Soit une variété Riemannienne compacte, de dimension plus grande que 4, localement Euclidienne, c'est à dire pour tout $x \in M$, $Rm_g(x) = 0$. Si h une fonction critique pour g telle que pour tout $x \in M$,

$$h(x) > \frac{(n-2)^2 \Delta f(x)}{2(n-1) \omega_n^{\frac{2}{n}} f(x)}$$

Alors il existe une fonction extrémale pour h .

Preuve : Soit $(\alpha_t)_{t \in [0,1]}$ une déformation continue de h telle que

$$\alpha_1 = h$$

$$\forall t \in [0, 1[, \mu_{f, \alpha_t} < \frac{1}{K(n, 2)(\sup f)^{\frac{n-2}{n}}} \quad (1)$$

Prenons $\alpha_t(x) = th(x) + (1-t)w(x)$ où $w(x) = \frac{(n-2)^2 \Delta f(x)}{2(n-1) \omega_n^{\frac{2}{n}} f(x)}$

les techniques standards elliptiques

et (1) donne l'existence d'une famille de fonctions u_t de $C^\infty(M)$, positives telles que

$$\forall x \in M, \Delta_g u_t(x) + \alpha_t(x) u_t(x) = \mu_{f, \alpha_t} f(x) u_t(x)^{2^*-1} \quad (2)$$

$$\int_M f u_t^{2^*} dv_g = 1 \quad (3)$$

où $\mu_{f, \alpha_t} = \{\inf I_{g, \alpha_t}(\phi) | \phi \in H_1^2(M) \phi \neq 0\}$

La famille u_t est bornée dans $H_1^2(M)$

A extraction près, il existe une fonction $u \geq 0$ dans $H_1^2(M)$, telle que

$$u_t \text{ converge vers } u \quad \begin{cases} \text{faiblement} & \text{dans } H_1^2(M) \\ \text{fortement} & \text{dans } L^2(M) \end{cases}$$

quand $t \rightarrow 1$

$$\lim_{t \rightarrow 1^-} \mu_{f, \alpha_t} = \frac{1}{K(n, 2)(\sup f)^{\frac{n-2}{n}}} \quad (4)$$

Le principe du maximum donne que la solution u est identiquement nulle ou, que $u > 0$. Si $u > 0$ nous avons trouvé une fonction extrémale. En revanche si u est identiquement nulle, on utilise les techniques de Blow-up.

Introduisons x_t la famille de points en laquelle $u_t(x_t) = \|u_t\|_\infty$. En considérant la famille d'applications $\exp_{x_t}$ qui réalise un difféomorphisme de $B(0, \delta) \subset \mathbf{R}^n$ sur la boule $B(x_t, \delta)$ on va se ramener au cas Euclidien, afin d'utiliser l'inégalité de Sobolev Euclidien à savoir

$$\left(\int_{\mathbf{R}^n} |q(x)|^{2^*} dx \right)^{\frac{2}{2^*}} \leq K(n, 2) \int_{\mathbf{R}^n} |\nabla(q(x))|^2 dx$$

Et d'aboutir à la contradiction $h(x_0) < w(x_0)$ par des estimées

$$g_t(x) = \exp_{x_t}^* g(x), v_t(x) = u_t(\exp_{x_t}(x)) \quad \text{avec } x \in B(0, \delta)$$

La famille de métrique g_t est obtenu comme le pull-back de la métrique g . u_t possède un seul point de concentration x_0 dont nous rappelons la définition : $x_0 \in M$ est un point de concentration pour u_t si pour tout $\delta > 0$

$$\limsup_{t \rightarrow 1^-} \int_{B(x_0, \delta)} u_t^{2^*} dv_g > 0$$

Le principe de Moser itérative nous dit que les fonctions u_t tend vers 0 sur le complémentaire d'un voisinage du point de concentration x_0 dans la variété M .

Soit η une fonction $C^\infty(B(0, \delta))$ cut-off

$$\eta = \begin{cases} 1 & \text{sur } B(0, \delta/2) \\ 0 & \text{sur } M \setminus B(0, \delta) \end{cases}$$

Et $|\nabla \eta| \leq C\delta^{-1}$

On applique la fonction $\eta \cdot v_t$ de support contenu dans $B(0, \delta)$ dans l'inégalité de Sobolev Euclidien

$$\left(\int_{\mathbf{R}^n} |\eta \cdot v_t|^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} \leq K(n, 2) \int_{\mathbf{R}^n} |\nabla_\xi(\eta \cdot v_t)|^2 d\xi$$



ETAPE 1
MONTRONS QUE

$$\frac{\int_{B(0,\delta)} \eta^2 v_t^2 \alpha_t d\xi}{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi} \leq \frac{C^2 \delta^{-2} \int_{B(0,\delta) \setminus B(0,\delta/2)} v_t^2 d\xi}{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi} + \frac{A_t(f)}{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi}$$

Avec

$$A_t(f) = \frac{1}{K(n, 2)} \left(\frac{1}{\|f\|_{\infty}^{\frac{2}{2^*}}} \int_{B(0,\delta)} \eta^2 f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*} d\xi - \left(\int_{B(0,\delta)} (\eta v_t)^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} \right)$$

Un calcul donne

$$\begin{aligned} \int_{B(0,\delta)} |\nabla_{\xi}(\eta \cdot v_t)|_{\xi}^2 d\xi &= \int_{B(0,\delta)} \partial_i(\eta v_t) \partial_j(\eta v_t) d\xi \\ &= \int_{B(0,\delta)} v_t^2 |\nabla \eta|_{\xi}^2 d\xi + 2 \int_{B(0,\delta)} \eta v_t (\nabla \eta | \nabla v_t)_{\xi} d\xi + \int_{B(0,\delta)} \eta^2 |\nabla v_t|_{\xi}^2 d\xi \end{aligned}$$

En utilisant la fonction cut-off nous obtenons

$$\int_{R^n} |\nabla_{\xi}(\eta \cdot v_t)|_{\xi}^2 d\xi \leq C^2 \delta^{-2} \int_{B(0,\delta) \setminus B(0,\delta/2)} v_t^2 d\xi + \int_{B(0,\delta)} \eta^2 v_t \Delta_{\xi} v_t d\xi$$

La variété est localement Euclidien on a $\Delta_{\xi} v_t = \Delta_{g_t} v_t$

$$\Delta_{g_t} v_t + \alpha_t(\exp_{x_t}(x)) v_t(x) = \mu_{\alpha_t} f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*-1}(x)$$

On reporte $\Delta_{g_t} v_t$ dans la deuxième intégrale de l'inégalité ci-dessus

$$\begin{aligned} \int_{R^n} |\nabla_{\xi}(\eta \cdot v_t)|_{\xi}^2 d\xi &\leq C^2 \delta^{-2} \int_{B(0,\delta) \setminus B(0,\delta/2)} v_t^2 d\xi + \mu_{\alpha_t} \int_{B(0,\delta)} \eta^2 f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*} d\xi - \\ &\quad \int_{B(0,\delta)} \eta^2 \alpha_t v_t^2 d\xi \end{aligned}$$

Cette majoration de $\int_{R^n} |\nabla_{\xi}(\eta \cdot v_t)|_{\xi}^2 d\xi$ on l'injecte dans

l'inégalité de Sobolev Euclidien d'où

$$\left(\int_{R^n} |\eta \cdot v_t|^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} \leq K(n, 2) C^2 \delta^{-2} \int_{B(0, \delta) \setminus B(0, \delta/2)} v_t^2 d\xi +$$

$$K(n, 2) \mu_{\alpha_t} \int_{B(0, \delta)} \eta^2 f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*} d\xi - K(n, 2) \int_{B(0, \delta)} \eta^2 \alpha_t v_t^2 d\xi$$

A partir de là on a une majoration de $\int_{B(0, \delta)} \eta^2 \alpha_t v_t^2 d\xi$

$$\int_{B(0, \delta)} \eta^2 \alpha_t v_t^2 d\xi \leq C^2 \delta^{-2} \int_{B(0, \delta) \setminus B(0, \delta/2)} v_t^2 d\xi + \mu_{\alpha_t} \int_{B(0, \delta)} \eta^2 f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*} d\xi -$$

$$\left(\int_{R^n} |\eta \cdot v_t|^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}}$$

Comme $\mu_{\alpha_t} \leq \frac{1}{K(n, 2)(\sup f)^{\frac{n-2}{n}}}$ on obtient

$$\frac{\int_{B(0, \delta)} \eta^2 v_t^2 \alpha_t d\xi}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi} \leq \frac{C^2 \delta^{-2} \int_{B(0, \delta) \setminus B(0, \delta/2)} v_t^2 d\xi}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi} + \frac{A_t(f)}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi}$$

$$\text{Avec } A_t(f) = \frac{1}{K(n, 2)} \left(\frac{1}{\|f\|_{\infty}^{\frac{2}{2^*}}} \int_{B(0, \delta)} \eta^2 f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*} d\xi - \left(\int_{B(0, \delta)} (\eta v_t)^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} \right)$$

Il nous reste à étudier

$$\limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{\int_{B(0, \delta)} \eta^2 v_t^2 \alpha_t d\xi}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi}$$

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{\int_{B(0, \delta) \setminus B(0, \delta/2)} v_t^2 d\xi}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi}$$

$$\limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{A_t(f)}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi}$$



ETAPE 2

Nous avons comme dans [2]

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{\int_{B(0,\delta) \setminus B(0,\delta/2)} v_t^2 d\xi}{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi} = 0$$



ETAPE 3

Etude de

$$\limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{A_t(f)}{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi}$$

Posons

$$D_t(f) = K(n, 2)A_t(f) = \frac{1}{\|f\|^{\frac{2}{2^*}}} \left(\int_{B(0,\delta)} \eta(x)^2 f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*}(x) d\xi \right) - \left(\int_{B(0,\delta)} (\eta v_t)^{2^*}(x) d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}}$$

Posons $\beta_t = \|u_t\|^{\frac{2}{2-n}}$ tend vers 0 quand t tend vers 1^- .

Pour x appartenant à la boule $B(0, \frac{\delta}{\beta_t}) \subset R^n$, $\tilde{g}_t(x) = g_t(\beta_t x) = (\exp_{x_t}^* g)(\beta_t x)$

$\varphi_t(x) = \beta_t^{\frac{n-2}{2}} u_t(\exp_{x_t}(\beta_t x))$ vérifie l'équation

$$\Delta_{\tilde{g}_t} \varphi_t(x) + \beta_t^2 \alpha_t(\exp_{x_t}(\beta_t x)) \varphi_t(x) = \mu_{\alpha_t} f(\exp_{x_t}(\beta_t x)) \varphi_t^{2^*-1}(x)$$

Quand t tend vers 1^- on a

$$\Delta_\xi \varphi = \frac{1}{K(n, 2) \|f\|^{\frac{2}{2^*}}} f(\exp_{x_0}(0)) \varphi^{2^*-1} = \frac{f(P)^{\frac{2}{n}}}{K(n, 2)} \varphi^{2^*-1}$$

où $f(\exp_{x_0}(0)) = f(x_0)$. Avec Caffarelli-Gidas-Spruck [4] on a

$$\varphi(x) = \frac{1}{K(n, 2)^{\frac{n-2}{4}} f(P)^{\frac{1}{2^*}}} \left(1 + \frac{|x|^2}{n(n-2)K(n, 2)^2} \right)^{1-\frac{n}{2}}$$

La variété est localement Euclidienne la métrique g_t et ξ coïncident

localement.

Posons $x = \beta_t y$, $x^i = \beta_t y^i$ dans $D_t(f)$ on obtient

$$D_t(f) = \frac{1}{\|f\|^{\frac{2}{2^*}}} \left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \eta(\beta_t y)^2 f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t \right) - \left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} (\eta(\beta_t y) v_t(\beta_t y))^{2^*} d\tilde{g}_t \right)^{\frac{2}{2^*}}$$

Nous allons appliquer l'inégalité d'Holder à la première intégrale en écrivant

$$\eta(\beta_t y)^2 f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t^{2^*}(\beta_t y) = \left(f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t(\beta_t y)^{\frac{4}{n-2}} \right) (\eta(\beta_t y)^2 v_t^2(\beta_t y))$$

D'où la majoration de la première intégrale intervenant dans $D_t(f)$

$$\begin{aligned} & \frac{1}{\|f\|^{\frac{2}{2^*}}} \int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \eta(\beta_t y)^2 f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t = \\ & \leq \frac{1}{\|f\|^{\frac{2}{2^*}}} \left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \left(f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t(\beta_t y)^{\frac{4}{n-2}} \right)^{\frac{n}{2}} d\tilde{g}_t \right)^{\frac{2}{n}} \left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} (\eta(\beta_t y)^2 v_t^2(\beta_t y))^{\frac{n}{n-2}} d\tilde{g}_t \right)^{\frac{n-2}{n}} \end{aligned}$$

En tenant compte du lemme 1 que nous prouverons à la fin de l'étape 3

Lemme 1 *Le point de concentration P de la famille u_t coïncide avec le maximum de f , $f(P) = \|f\|_\infty$*

Nous obtenons la majoration de

$$D_t(f) \leq \left(\frac{1}{f(P)^{\frac{2}{2^*}}} \left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} f^{\frac{n}{2}}(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t(\beta_t y)^{2^*} d\tilde{g}_t \right)^{\frac{2}{n}} - 1 \right) \times \left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \eta(\beta_t y)^{2^*} v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t \right)^{\frac{2}{2^*}}$$

On écrit $f^{\frac{n}{2}} v_t^{2^*} = f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t^{2^*}(\beta_t y) f^{\frac{n}{2}-1}(\exp_{x_t}(\beta_t y))$ afin de pouvoir utiliser ultérieurement $\int_M f \cdot u_t^{2^*} dv_g = 1$

On effectue un développement de $f^{\frac{n}{2}-1}(\exp_{x_t}(\beta_t y))$ d'où

$$f^{\frac{n}{2}} v_t^{2^*} = f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t^{2^*}(\beta_t y) \left(f(x_t) + \partial_i f(x_t) \beta_t y^i + \frac{1}{2} \partial_{ij} f(x_t) \beta_t^2 y^i y^j + o(r^2) \right)^{\frac{n}{2}-1} =$$

$$f(\exp_{x_t}(\beta_t y))v_t^{2^*}(\beta_t y)(f(x_t))^{\frac{n-2}{2}}\left(1+\frac{n-2}{2}\frac{\partial_i f(x_t)\beta_t y^i}{f(x_t)}+\frac{n-2}{4}\frac{\partial_{ij} f(x_t)}{f(x_t)}\beta_t^2 y^i y^j+\right. \\ \left.\frac{(n-2)(n-4)}{8}\left(\frac{\partial_i f(x_t)\beta_t y^i}{f(x_t)}\right)^2\beta_t^2 y^{i2}+o(r^2)\right)$$

Donc l'expression $\left(\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})} f^{\frac{n}{2}}(\exp_{x_t}(\beta_t y))v_t(\beta_t y)^{2^*} d\tilde{g}_t\right)^{\frac{2}{n}}$ devient

$$\left(\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})} [(f(x_t))^{\frac{n-2}{2}} f(\exp_{x_t}(\beta_t y))v_t(\beta_t y)^{2^*} + \right. \\ \frac{n-2}{2}(f(x_t))^{\frac{n-4}{2}} \partial_i f(x_t) f(\exp_{x_t}(\beta_t y))v_t(\beta_t y)^{2^*} \beta_t y^i + \\ \frac{(n-2)(n-4)}{8}(f(x_t))^{\frac{n-6}{2}} (\partial_i f(x_t))^2 f(\exp_{x_t}(\beta_t y))v_t(\beta_t y)^{2^*} \beta_t^2 y^{i2} + \\ \left. \frac{n-2}{4}(f(x_t))^{\frac{n-4}{2}} \partial_{ij} f(x_t) f(\exp_{x_t}(\beta_t y))v_t(\beta_t y)^{2^*} \beta_t^2 y^i y^j + o(r^2)] d\tilde{g}_t\right)^{\frac{2}{n}}$$

Dans l'expression précédente les termes où interviennent $\partial_i f(x_t)$ qui tendent

vers $\nabla f(P)$ vont s'annuler, donc

$$\limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{D_t(f)}{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi} \leq \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{\left(\frac{1}{f(P)^{\frac{2}{2^*}}} \left(\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})} f^{\frac{n}{2}}(\exp_{x_t}(\beta_t y))v_t(\beta_t y)^{2^*} d\tilde{g}_t\right)^{\frac{2}{n}} - 1\right)}{\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})} v_t^2(\beta_t y) d\tilde{g}_t} \times \\ \left(\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})} \eta(\beta_t y)^{2^*} v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t\right)^{\frac{2}{2^*}} \leq \\ \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{\left(\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})} \eta(\beta_t y)^{2^*} v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t\right)^{\frac{2}{2^*}}}{\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})} v_t^2(\beta_t y) d\tilde{g}_t} \times \\ \left(\frac{1}{f(P)^{\frac{2}{2^*}}} \left(\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})} ((f(x_t))^{\frac{n-2}{2}} \int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})} f(\exp_{x_t}(\beta_t y))v_t(\beta_t y)^{2^*} d\tilde{g}_t + \right.\right.$$

$$\frac{n-2}{4}(f(x_t))^{\frac{n-4}{2}}\partial_{ij}f(x_t)\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}f(\exp_{x_t}(\beta_ty))v_t(\beta_ty)^{2^*}\beta_t^2y^iy^jd\tilde{g}_t+\\ \partial_if(x_t)F_t^i+o(\delta^2))^{\frac{2}{n}}-1)$$

Dans l'expression ci-dessus on majore la première intégrale par $\int_M f.u_t^{2^*}dv_g$ qui vaut 1 et $\partial_if(x_t)F_t^i$ tend vers 0 quand t tend vers 1^- car β_t tend vers 0 quand t tend vers 1^- où

$$F_t^i=\frac{n-2}{2}(f(x_t))^{\frac{n-4}{2}}\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}f(\exp_{x_t}(\beta_ty))v_t(\beta_ty)^{2^*}\beta_t^2y^id\tilde{g}_t+\\ \frac{(n-2)(n-4)}{8}(f(x_t))^{\frac{n-6}{2}}\partial_if(x_t)\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}f(\exp_{x_t}(\beta_ty))v_t(\beta_ty)^{2^*}\beta_t^2y^{i2}d\tilde{g}_t$$

nous obtenons

$$\limsup_{t\rightarrow 1^-}\frac{D_t(f)}{\int_{B(0,\delta)}v_t^2d\xi}\leq\\ \limsup_{t\rightarrow 1^-}\frac{\left(\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}\eta(\beta_ty)^{2^*}v_t^{2^*}(\beta_ty)d\tilde{g}_t\right)^{\frac{2}{2^*}}}{\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}v_t^2(\beta_ty)d\tilde{g}_t}\times\\ \left(\frac{1}{f(P)^{\frac{2}{2^*}}}\left((f(x_t))^{\frac{n-2}{2}}\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}f(\exp_{x_t}(\beta_ty))v_t(\beta_ty)^{2^*}d\tilde{g}_t+\\ \frac{n-2}{4}(f(x_t))^{\frac{n-4}{2}}\partial_{ij}f(x_t)\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}f(\exp_{x_t}(\beta_ty))v_t(\beta_ty)^{2^*}\beta_t^2y^iy^jd\tilde{g}_t+\\ \partial_if(x_t)F_t^i+o(\delta^2))^{\frac{2}{n}}-1\right)\leq\\ \limsup_{t\rightarrow 1^-}\frac{\left(\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}\eta(\beta_ty)^{2^*}v_t^{2^*}(\beta_ty)d\tilde{g}_t\right)^{\frac{2}{2^*}}}{\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}v_t^2(\beta_ty)d\tilde{g}_t}\times\\ \left(\frac{1}{f(P)^{\frac{2}{2^*}}}\left((f(x_t))^{\frac{n-2}{2}}+\\ \frac{n-2}{4}(f(x_t))^{\frac{n-4}{2}}\partial_{ij}f(x_t)\int_{B(0,\frac{\delta}{\beta_t})}f(\exp_{x_t}(\beta_ty))v_t(\beta_ty)^{2^*}\beta_t^2y^iy^jd\tilde{g}_t+\\ \right.\right.$$

$$\begin{aligned}
& \partial_i f(x_t) F_t^i + o(\delta^2))^\frac{2}{n} - 1) \leq \\
& \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{\left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \eta(\beta_t y)^{2^*} v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t \right)^\frac{2}{2^*}}{\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} v_t^2(\beta_t y) d\tilde{g}_t} \times \\
& \left(\frac{1}{f(P)^\frac{2}{2^*}} \left(((f(x_t))^\frac{n-2}{2} + \right. \right. \\
& \left. \left. \frac{n-2}{4} (f(x_t))^\frac{n-4}{2} \partial_{ij} f(x_t) \int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t(\beta_t y)^{2^*} \beta_t^2 y^i y^j d\tilde{g}_t + \right. \right. \\
& \left. \left. \partial_i f(x_t) F_t^i + o(\delta^2))^\frac{2}{n} - 1) \right)
\end{aligned}$$

D'où

$$\begin{aligned}
& \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{D_t(f)}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi} \leq \\
& \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{\left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \eta(\beta_t y)^{2^*} v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t \right)^\frac{2}{2^*}}{\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} v_t^2(\beta_t y) d\tilde{g}_t} \times \\
& \left(\frac{f(x_t)^\frac{2}{2^*}}{f(P)^\frac{2}{2^*}} \left(1 + \frac{n-2}{2n} \frac{\partial_{ij} f(x_t)}{f(x_t)} \int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t(\beta_t y)^{2^*} \beta_t^2 y^i y^j d\tilde{g}_t + \frac{2}{n} \frac{\partial_i f(x_t)}{((f(x_t))^\frac{n-2}{2})} F_t^i + o(\delta^2) \right) - 1 \right)
\end{aligned}$$

Soit encore

$$\begin{aligned}
& \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{D_t(f)}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi} \leq \\
& \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{\frac{f(x_t)^\frac{2}{2^*}}{f(P)^\frac{2}{2^*}} \frac{n-2}{2n} \frac{\partial_{ij} f(x_t)}{f(x_t)} \int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) v_t(\beta_t y)^{2^*} \beta_t^2 y^i y^j d\tilde{g}_t}{\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} v_t(\beta_t y)^2 \tilde{g}_t} \times \\
& \left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \eta(\beta_t y)^{2^*} v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t \right)^\frac{2}{2^*}
\end{aligned}$$

On obtient une majoration de la dernière intégrale en introduisant f

$$\left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \eta(\beta_t y)^{2^*} v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t \right)^\frac{2}{2^*} =$$

$$\begin{aligned}
& \left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \frac{1}{f(\exp_{x_t}(\beta_t y))} f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) \eta(\beta_t y)^{2^*} v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t \right)^{\frac{2}{2^*}} \leq \\
& \left(\sup_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \frac{1}{f(\exp_{x_t}(\beta_t y))} \right)^{\frac{2}{2^*}} \left(\int_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} f(\exp_{x_t}(\beta_t y)) \eta(\beta_t y)^{2^*} v_t^{2^*}(\beta_t y) d\tilde{g}_t \right)^{\frac{2}{2^*}} \leq \\
& \left(\sup_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \frac{1}{f(\exp_{x_t}(\beta_t y))} \right)^{\frac{2}{2^*}} \left(\int_M f(x) u_t^{2^*}(x) dg(x) \right)^{\frac{2}{2^*}} \leq \left(\sup_{B(0, \frac{\delta}{\beta_t})} \frac{1}{f(\exp_{x_t}(\beta_t y))} \right)^{\frac{2}{2^*}}
\end{aligned}$$

Comme $v_t(\beta_t y) = u_t(\exp_{x_t}(\beta_t y)) = \beta_t^{1-\frac{n}{2}} \varphi_t(y)$, $v_t^2(\beta_t y) = \beta_t^{2-n} \varphi_t^2(y)$
 $v_t^{2^*}(\beta_t y) = \beta_t^{-n} \varphi_t^{2^*}(y)$

Donc

$$\begin{aligned}
& \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{D_t(f)}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi} \leq \\
& \frac{\frac{n-2}{2n^2} \frac{\Delta f(P)}{f(P)} \int_{R_+} f(P) \varphi^{2^*}(r) r^2 r^{n-1} dr}{\int_{R_+} \varphi^2(r) r^{n-1} dr} \times \left(\frac{1}{f(P)} \right)^{\frac{2}{2^*}} = \\
& \frac{n-2}{2n^2} \frac{\Delta f(P)}{f(P)^{\frac{2}{2^*}}} \frac{\int_{R_+} f(P) \varphi^{2^*}(r) r^{n+1} dr}{\int_{R_+} \varphi^2(r) r^{n-1} dr}
\end{aligned}$$

Car,

$$\limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{1}{f(\exp_{x_t}(\beta_t y))} = \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{1}{f(\exp_{x_t}(0))} = \frac{1}{f(x_0)} = \frac{1}{f(P)}$$

$$\text{où } \varphi(r) = \frac{1}{K(n, 2)^{\frac{n-2}{4}} f(P)^{\frac{1}{2^*}}} \left(1 + \frac{r^2}{n(n-2)K(n, 2)} \right)^{1-\frac{n}{2}}$$

Il nous reste à estimer

$$\begin{aligned}
& \frac{\int_{R_+} \varphi^{2^*}(r) r^{n+1} dr}{\int_{R_+} \varphi^2(r) r^{n-1} dr} = \\
& \frac{1}{K(n, 2) f(P)^{\frac{2}{n}}} \frac{\int_{R_+} \frac{r^{n+1}}{(1 + br^2)^n} dr}{\int_{R_+} \frac{r^{n-1}}{(1 + br^2)^{n-2}} dr} \quad \text{avec } b = \frac{1}{n(n-2)K(n, 2)^2}
\end{aligned}$$

On intègre par parties deux fois le numérateur ce qui donne

$$\int_{R_+} \frac{r^{n+1}}{(1+br^2)^n} dr = \frac{n}{4(n-1)b^2} \int_{R_+} \frac{r^{n-3}}{(1+br^2)^{n-2}} dr$$

D'où

$$\frac{\int_{R_+} \varphi^{2^*}(r) r^{n+1} dr}{\int_{R_+} \varphi^2(r) r^{n-1} dr} \leq \frac{n}{4(n-1)} \frac{n^2(n-2)^2 K(n, 2)^4}{K(n, 2) f(P)^{\frac{2}{n}}}$$

Finalement en tenant compte que $K(n, 2)^2 = \frac{4}{n(n-2)\omega_n^{\frac{2}{n}}}$

$$\begin{aligned} \limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{D_t(f)}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi} &\leq \\ \frac{n-2}{2n^2} \frac{\Delta f(P)}{f(P)^{\frac{2}{2^*}}} \frac{n}{4(n-1)} \frac{n^2(n-2)^2 K(n, 2)^4}{K(n, 2) f(P)^{\frac{2}{n}}} &= \\ \frac{(n-2)^2 K(n, 2) \Delta f(P)}{2(n-1) \omega_n^{\frac{2}{n}} f(P)} \end{aligned}$$

Avec $A_f(t)$

$$\limsup_{t \rightarrow 1^-} \frac{A_f(t)}{\int_{B(0, \delta)} v_t^2 d\xi} \leq \frac{(n-2)^2 \Delta f(P)}{2(n-1) \omega_n^{\frac{2}{n}} f(P)}$$

Et pour terminer voici la preuve du lemme 1

Par l'absurde si $f(P) < \|f\|$, comme f est continue et que x_t tend vers 1^- on choisit $\delta = \delta_0 > 0$ petit, et, $t = t_0$ proche de 1^- de sorte que

$$\frac{\sup_{B(x_{t_0}, \delta_0)} f(x)}{\|f\|} < \frac{1}{3} \quad \text{et} \quad \frac{K(n, 2)C^2}{\delta_0} \frac{\int_{B(0, \delta)} v_{t_0}^2 d\xi}{\left(\int_{B(0, \delta)} \eta^{2^*} v_{t_0}^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}}} < \frac{1}{3}$$

On part de l'équation

$$\Delta v_t + \beta_t^2 \alpha_t(\exp_{x_t}(x)) v_t = \mu_{\alpha_t} f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*-1}$$

où $v_t(x) = u_t(\exp_{x_t}(x))$, on multiplie l'équation par $\eta^2 v_t$ puis on intègre sur la boule $B(0, \delta)$

$$\int_{B(0, \delta)} \eta^2 v_t \Delta v_t d\xi \leq \mu_{\alpha_t} \int_{B(0, \delta)} \eta^2 f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*} d\xi \quad 1'$$

D'autre part en intégrant par parties

$$\int_{B(0,\delta)} \eta^2 v_t \Delta v_t d\xi = 2 \int_{B(0,\delta)} \eta v_t (\nabla \eta |\nabla v_t|) d\xi + \int_{B(0,\delta)} \eta^2 |\nabla v_t|^2 d\xi$$

Sachant que

$$\int_{B(0,\delta)} |\nabla(\eta v_t)|^2 d\xi = \int_{B(0,\delta)} v_t^2 |\nabla \eta|^2 d\xi + \int_{B(0,\delta)} \eta^2 |\nabla v_t|^2 d\xi + 2 \int_{B(0,\delta)} \eta v_t (\nabla \eta |\nabla v_t|) d\xi$$

Nous arrivons à

$$\int_{B(0,\delta)} |\nabla(\eta v_t)|^2 d\xi = \int_{B(0,\delta)} v_t^2 |\nabla \eta|^2 d\xi + \int_{B(0,\delta)} \eta^2 v_t \Delta v_t d\xi \quad 2'$$

On utilise l'inégalité de Sobolev Euclidien

$$\left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} \leq K(n, 2) \int_{B(0,\delta)} |\nabla(\eta v_t)|^2 d\xi \quad 3'$$

1' 2' 3' donnent

$$\left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} \leq K(n, 2) \int_{B(0,\delta)} v_t^2 |\nabla \eta|^2 d\xi + K(n, 2) \int_{B(0,\delta)} \eta^2 v_t \Delta v_t d\xi \quad 4'$$

Comme $\eta^2 f(\exp_{x_t}) v_t^{2^*} = f(\exp_{x_t}) v_t^{\frac{4}{n-2}} \cdot \eta^2 v_t^2$ on applique l'inégalité d'Holder avec $p = \frac{2^*}{2}, q = \frac{n}{2}$ d'où

$$\int_{B(0,\delta)} \eta^2 f(\exp_{x_t}) v_t^{2^*} d\xi \leq \left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} \left(\int_{B(0,\delta)} f^{\frac{n}{2}}(\exp_{x_t}) v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{n}} \quad 5'$$

1' 4' 5' donnent

$$\begin{aligned} \left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} &\leq K(n, 2) \int_{B(0,\delta)} v_t^2 |\nabla \eta|^2 d\xi + \\ &K(n, 2) \mu_{\alpha_t} \left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} \left(\int_{B(0,\delta)} f^{\frac{n}{2}}(\exp_{x_t}) v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{n}} \end{aligned} \quad 6'$$

Comme $|\nabla \eta| \leq \frac{C}{\delta}$ et $\mu_{\alpha_t} \leq \frac{1}{K(n, 2) \|f\|^{\frac{n-2}{n}}}$ et

$$\begin{aligned} \left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} &\leq \frac{K(n,2)C^2}{\delta^2} \int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi + \\ \frac{1}{\|f\|^{\frac{n-2}{n}}} \left(\int_{B(0,\delta)} f^{\frac{n}{2}}(\exp_{x_t}) v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{n}} &\left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} \end{aligned} \quad 7'$$

En utilisant $f^{\frac{n}{2}} v_t^{2^*} = f^{\frac{n-2}{2}} f v_t^{2^*}$ on a

$$\left(\int_{B(0,\delta)} f^{\frac{n}{2}}(\exp_{x_t}) v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{n}} \leq \left(\sup_{B(x_t,\delta)} f(x)^{\frac{n-2}{n}} \right)^{\frac{2}{n}} \left(\int_{B(0,\delta)} f(\exp_{x_t}(x)) v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{n}}$$

La dernière intégrale est majorée par $\int_M f u_t^{2^*} = 1$

7' devient

$$\begin{aligned} \left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} &\leq \frac{K(n,2)C^2}{\delta^2} \int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi + \\ \frac{\sup_{B(x_t,\delta)} f(x)^{\frac{n-2}{n}}}{\|f\|^{\frac{n-2}{n}}} \left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}} &\end{aligned} \quad 8'$$

Soit encore

$$1 \leq \frac{K(n,2)C^2}{\delta^2} \frac{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi}{\left(\int_{B(0,\delta)} \eta^{2^*} v_t^{2^*} d\xi \right)^{\frac{2}{2^*}}} + \left(\frac{\sup_{B(x_t,\delta)} f(x)}{\|f\|} \right)^{\frac{n-2}{n}}$$

En choisissant $\delta = \delta_0$ et $t = t_0$ dans la précédente inégalité nous avons la contradiction $1 \leq \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$



ETAPE 4

Arriver à une contradiction

En faisant tendre t vers 1 dans l'inégalité suivante

$$\begin{aligned} \frac{\int_{B(0,\delta)} \eta^2 v_t^2 \alpha_t d\xi}{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi} &\leq \frac{C^2 \delta^{-2} \int_{B(0,\delta) \setminus B(0,\delta/2)} v_t^2 d\xi}{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi} + \frac{A_t(f)}{\int_{B(0,\delta)} v_t^2 d\xi} \\ h(P) &\leq \frac{(n-2)^2 \Delta f(P)}{2(n-1) \omega_n^{\frac{2}{n}} f(P)} \end{aligned}$$

Références

- [1] E. HEBEY– Introduction à l'analyse non linéaire sur les variétés, *Diderot Editeur, Arts et Sciences, 1997*
- [2] E. HEBEY,M.VAUGON– From best constants to critical functions,
- [3] Z. DJADLI,O. DRUET– Extremal functions for optimal Sobolev inequalities on compact manifolds
- [4] L.A.CAFFARELLI,B.GIDAS,J.SPRUCK, Asymptotic symmetry and local behavior of semilinear elliptic equations with Sobolev growth,Communications on Pure and Applied Mathematics ,42,1989,271-297.

I thanks M.Vaugon for suggesting me this problem.